

Banque CCINP : Ex. 34, 35, 36, 37, 40,44, 45.

### Ouverts, fermés

**Exercice 1** (Groupe des périodes d'une fonction continue). Soit  $f$  une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $\Pi_f = \{ T \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x+T) = f(x) \}$  l'ensemble des périodes de  $f$  (auxquelles on a rajouté 0).

- Montrer que  $\Pi_f$  est un sous-groupe de  $(\mathbb{R}, +)$ .
- Montrer que si  $f$  est continue alors  $\Pi_f$  est un fermé de  $\mathbb{R}$ .
- Montrer que la conclusion du b) n'est pas vraie si  $f$  n'est pas continue, par exemple avec la fonction indicatrice de  $\mathbb{Q}$  dans  $\mathbb{R}$ .
- En admettant le résultat de l'exercice 6 ci-dessous, montrer que si  $f$  est une fonction continue périodique sur  $\mathbb{R}$  non constante alors  $f$  admet une plus petite période strictement positive, appelée la période de  $f$ .

**Exercice 2.** Soit  $(x_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  une suite *strictement croissante*.

Donner une CNS pour que l'ensemble  $X = \{x_n, n \in \mathbb{N}\}$  soit un fermé de  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 3** (Quasi QdC). Soient  $A$  et  $B$  deux parties d'un e.v.n.  $E$ .

- Quelle relation y-a-t-il entre  $\overline{A \cap B}$  et  $\overline{A} \cap \overline{B}$ ? (Inclusion, égalité, contre-exemples pour une inclusion?)
- Même question pour  $\text{Int}(A \cup B)$  et  $\text{Int}(A) \cup \text{Int}(B)$ .
- Quelles relations entre  $\text{Int}(E \setminus A)$ ,  $\overline{E \setminus A}$ ,  $E \setminus \overline{A}$ ,  $E \setminus \text{Int}(A)$ ?

**Exercice 4.** a) Soit  $E$  un e.v.n. et  $A$  et  $B$  deux parties de  $E$ .

Montrer que si  $B$  est ouvert et  $A \cap B = \emptyset$  alors  $\overline{A} \cap B = \emptyset$ .

b) Soit  $U$  un ouvert d'un e.v.n. Montrer que  $Fr(U)$  est d'intérieur vide.

**Exercice 5.** Soit  $E$  un e.v.n. et  $C \subset E$  un ensemble convexe. Montrer que :

- $\overline{C}$  est convexe.
- $\overset{\circ}{C}$  est convexe.
- Soit  $C$  un ensemble convexe d'intérieur non vide. Soit  $x \in \overset{\circ}{C}$  et  $y \in \overline{C}$ . Montrer que  $[x, y[ \subset \overset{\circ}{C}$ .

**Exercice 6** (Sous-groupes de  $(\mathbb{R}, +)$ ) : (dém. centrale-Mines, mais il est bon de connaître le résultat pour des applications comme le 3)). Soit  $G$  un sous-groupe de  $(\mathbb{R}, +)$  tel que  $G \neq \{0\}$ . Soit  $\alpha = \inf G \cap \mathbb{R}^{++}$ .

- On suppose ici que  $\alpha > 0$ .
  - Montrer que  $\alpha \in G$ .
  - Montrer qu'alors  $G = \alpha\mathbb{Z}$ .
  - En déduire que dans ce cas  $G$  est fermé dans  $\mathbb{R}$ .
- On suppose que  $\alpha = 0$ . Montrer que  $G$  est dense dans  $\mathbb{R}$ .  
Avec 1) et 2) on a démontré qu'un sous-groupe de  $(\mathbb{R}, +)$  est ou bien de la forme  $\alpha\mathbb{Z}$  ou bien dense.
- Une application : si  $a$  et  $b$  sont deux réels non nuls, montrer que  $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$  est dense ssi  $a/b \notin \mathbb{Q}$ .  
*Indication* – On regardera l'équivalence des négations.

### Topologie dans $M_n(\mathbb{K})$ et applications

**Exercice 7.** Soit  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ ,

a) Montrer que  $GL_n(\mathbb{K})$  est dense dans  $M_n(\mathbb{K})$ .

*Indication* – (M1) On pourra considérer pour approcher une matrice  $A \in M_n(\mathbb{K})$  les matrices de la forme  $A + \frac{1}{k}I_n$ .

(M2) Si  $A$  est de rang  $r$ , utiliser une forme réduite de  $A$  pour la relation d'équivalence, qu'on peut alors approcher facilement par des matrices inversibles.

b) Soit  $\Delta = \{A \in M_n(\mathbb{K}), \det(A) = 0\}$ . Déterminer l'adhérence et l'intérieur de  $\Delta$ .

**Exercice 8** (Densité dans  $M_n(\mathbb{C})$ ). a) Rappeler une C.S très simple sur les entrées diagonales d'une matrice T.S  $T \in M_n(\mathbb{K})$  pour que celle-ci soit diagonalisable.

b) Pour une matrice  $M \in TS_n(\mathbb{K})$ , construire une suite  $(A_k)_{k \in \mathbb{N}} \in TS_n(\mathbb{K})$  de matrices déduites de  $M$  par une petite perturbation des entrées diagonales de sorte que  $A_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} M$  (la perturbation tend vers zéro) et pour chaque  $k \in \mathbb{N}$ ,  $A_k$  admet  $n$  valeurs propres distinctes dans  $\mathbb{K}$ .

c) En déduire que l'ensemble  $\mathcal{D}_0$  des matrices de  $M_n(\mathbb{C})$  ayant  $n$  valeurs propres distinctes est *dense* dans  $M_n(\mathbb{C})$

d) En déduire que l'ensemble  $\mathcal{D}$  des matrices diagonalisables dans  $M_n(\mathbb{C})$  est *dense* dans  $M_n(\mathbb{C})$

**Exercice 9.** a) Démontrer le théorème de Cayley-Hamilton pour les matrices dz.

b) Démontrer que l'application  $M_n(\mathbb{K}) \rightarrow M_n(\mathbb{K}), A \mapsto \chi_A(A)$  est *continue*

c) En déduire le théorème de Cayley-Hamilton : pour toute matrice  $M \in M_n(\mathbb{C}), \chi_M(M) = 0$ .

**Continuité et Ouverts/fermés comme préimage d'ouverts/fermés par des applications continues**

**Exercice 10.** a) Montrer que l'application  $\chi : M_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}_n[X], A \mapsto \chi_A$  est continue

b) Soit  $A \in M_n(\mathbb{C})$ . On note  $S(A) = \{PAP^{-1}, P \in GL_n(\mathbb{C})\}$  l'ensemble des matrices semblables à  $A$ .

On suppose qu'il existe une suite  $(A_n) \in S(A)^{\mathbb{N}}$  de matrices toutes semblables à  $A$  ayant la propriété que  $A_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ .

Montrer que  $A$  est nilpotente.

**Exercice 11.** Soit  $E = M_{n,p}(\mathbb{R})$  et  $r \leq \min(n, p)$  un entier. On note  $G_r = \{A \in E, \text{rg}(A) \leq r\}$ . On note  $U_r = \{A \in E, \text{rg}(A) = r\}$ . a) Montrer que  $G_r$  est un fermé de  $E$ .

b) Montrer que  $G_r$  est exactement l'adhérence de  $U_r$ .

**Exercice 12.** Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -e.v. de dim. finie. Un endomorphisme  $L \in \mathcal{L}(E)$  est dit cyclique ssi il existe un vecteur  $u$  de  $E$  tel que la famille  $(u, L(u), \dots, L^{n-1}(u))$  soit une base de  $E$ .

(Dans cette base  $u$  est représenté par une matrice compagnon).

On dit aussi que  $L$  est cyclique pour le vecteur  $u$ .

a) Si  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ , montrer que l'ensemble des endomorphismes cycliques pour un vecteur  $u$  donné est un ouvert de  $\mathcal{L}(E)$ .

En déduire que l'ensemble des endomorphismes cycliques de  $E$  est ouvert dans  $\mathcal{L}(E)$  est ouvert.

b) Montrer qu'un endomorphisme ayant  $n$  valeur propres distinctes est cyclique pour un vecteur à préciser.

c) Montrer que si  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ , l'ensemble  $\mathcal{C}$  des matrices cycliques est dense dans  $M_n(\mathbb{C})$ .

**Continuité des applications linéaires/multi linéaire et Norme d'opérateur**

**BANQUE CCINP Ex. 38, contient l'ex. 16 ci-dessous dans lequel une méthode différente de celle du corrigé est proposée. Contient aussi un cas particulier de l'ex. 14.**

**Exercice 13.** Soit  $E$  l'e.v. des suites réelles convergentes, muni de la  $N_\infty$ . Soit  $L : E \rightarrow \mathbb{R}, u \in E \mapsto \lim u_n$ . Montrer que  $L$  est continue et déterminer sa norme d'opérateur.

**Exercice 14.** Justifier la continuité des applications suivantes avec le critère de continuité des applications linéaires ou bilinéaires. Dans le cas des A.L. déterminer leur norme d'opérateur. :

a) Si  $(E, \| \cdot \|)$  est un e.v.n. quelconque, alors l'addition  $E \times E \rightarrow E, (u, v) \mapsto u + v$  est continue.

b) Si  $(E, ( \cdot | \cdot ))$  est un espace préhilbertien, et que  $a \in E$  est un vecteur fixé, alors l'application  $\varphi_a : E \rightarrow \mathbb{R}, u \mapsto (a|u)$  est continue.

c) Si  $(E, \| \cdot \|)$  est un e.v.n. quelconque, montrer que l'application mult de  $\mathbb{R} \times E$  dans  $E$  qui à  $(\lambda, x)$  associe  $\lambda.x$  (la multiplication externe) est continue.

**Exercice 15.** Soit  $E = \mathbb{R}^2$  et  $f : E \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto ax + by$ .

On munit  $E$  de sa norme infinie. Montrer que la norme d'opérateur de  $f$  est  $\|f\| = |a| + |b|$ .

**Exercice 16** (Inclus dans la banque CCINP ici indic. différente). soit  $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$  muni de la norme  $\| \cdot \|_1$  définie par :  $\forall f \in E, \|f\|_1 = \int_0^1 |f|$ . Soit  $L : E \rightarrow E$  qui à  $f$  associe  $F : x \mapsto \int_0^x f$ .

Montrer que  $L$  est continue, puis déterminer sa norme d'opérateur.

*Indication pour la norme d'opérateur :* on pourra considérer la suite des fonctions  $(f_n)$ , continue affine par morceaux, avec  $f_n(0) = 1, f_n(1/n) = 0, f_n$  affine sur  $[0, 1/n]$  nulle sur  $[1/n, 1]$ .

**Exercice 17.** Soit  $E = \mathbb{C}[X]$  muni de la norme infinie sur les coefficients : si  $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k, \|P\| = \max_{k \in [0, n]} |a_k|$ . Soit  $(\alpha_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$  et  $\varphi : E \rightarrow \mathbb{C}$ , la forme linéaire définie par :  $P \mapsto \sum_{k=0}^n a_k \alpha_k$ .

Déterminer une C.N.S. sur la suite  $(\alpha_k)$  pour que la F.L.  $\varphi$  soit continue et dans ce cas déterminer sa norme d'opérateur.